

Březen v okrasné zahradě

V březnu už obvykle jaro získává zřetelnější obrys a přibývá i prací na zahradě.

- Začínají se probouzet mnohé trvalky, odumřelé stonky odstříhneme těsně nad zemí a trvalkový záhon vyhrabeme měkkými plastovými hráběmi, které nepoškodí rašící výhony. Půdu mezi trsy prokypříme a doplníme případný chybějící substrát či kompost.

- Ke konci měsíce ostříháme i vytrvalé okrasné trávy, které zdobili trvalkové záhony i přes zimu. Stébla sestříhneme co nejnižě u země.

- Na přelomu března a dubna je čas na sestříhání stálezelených bylin typu šalvěje lékařské, levandule či santoliny. Tyto polokeře ale nestříháme příliš hluboko, obvykle o polovinu či maximálně 2/3 výšky, tak aby na zbylých stoncích vždy zůstaly rašící výhony.

- Ke konci března, pokud již počasí dovolí, můžeme začít s dělením travlek. Jarní dělení je ale vhodné jen pro druhy, které kvetou později v létě nebo na podzim. Časně jarní druhy je lépe množit až po odkvětu. Trsy vyryjeme ze země a rýčem nebo zahradnickými nůžkami rozdělíme na více částí. Kořeny je možno zakrátit a rostliny pak znova vysadit.

- Vyséváme letničky do skleníku či pařeniště. Většina semen dobře vzchází při teplotě 18 °C. Mohou to být aksamitníky (*Tagetes*), třapatky (*Rudbeckia hirta*), karafiáty (*Dianthus chinensis*), cínie (*Zinnia*), kosmatec (*Dorotheanthus*), krásenky (*Cosmos*), nestárc (Ageratum), nevadlec (*Celosia*), pestrovka (*Gomphrena*), kokarda (*Gaillardia*) aj.

- Některé druhy lze koncem měsíce vysévat již přímo do volné půdy. Jde např. o okrasné odrůdy máku (*Papaver rhoeas* nebo *P. somniferum*), měsíček (*Calendula*), černucha (*Nigella*) nebo ostrožky (*Consolida*).

- Přesazujeme pokojové rostliny. Volíme kvalitní, spíše lehký zahradnický substrát, který lze dále doplnit specifickými komponenty podle nároků jednotlivých rostlin (např. perlit, hrubší písek, rozložený kompost). Rostliny obvykle přesazujeme do květináčů jen o málo větších než byly ty, v nichž rostly doposud.

- Zimované balkonové rostliny (muškáty nebo fuchsie), opět přivykáme na světlo a vyšší teploty. Rostliny po zimě sestříhneme a přesadíme do nového substrátu.

- Venkovní zahradě dominují v březnu zejména kvetoucí cibuloviny. V plném květu již obvykle počátkem března bývají kosatce (*Iris reticulata*), taloviny (*Eranthis*), sněženky (*Galanthus*). Po nich se začínají objevovat krokusy, narcisy a botanické tulipány. Cibulnaté rostliny je vhodné přihnojit plným hnojivem.

- Dřeviny se již plně probouzejí a začínají svůj vegetační cyklus. V zahradě kvetou zlatice (*Forsythia*), vrby (*Salix ssp.*), nebo dřín obecný (*Cornus mas*) a další. Ze stromů kvete americký javor stříbrný (*Acer saccharinum*) a javor červený (*Acer rubrum*). Začínají kvést také vřesoviště rostliny jako pěnišník časný (*Rhododendron x praecox*) a z drobných dřevin např. vřesovec pleťový (*Erica carnea*).

- S probouzením souvisejí i koloběh mízy, která již začíná plně v celé dřevině proutit. S tím je spojen i řez. Pokud se teploty pochybuji počátkem tohoto měsíce okolo nuly, lze řezat většinu druhů, hlavně však jabloně a jiné jádroviny. Mnoho dřevin však již začíná v tomto období při řezu ronit. Proto je třeba řezat uváženě ke vztahu k aktuálnímu počasí. Pokud již nemrzne, je vhodná doba na řez vystáří (*Wisteria*), odstranění starých kvetenství vřesů (*Calluna*).

- U záhonových růží odstraníme hrubky, které je chránily na zimu v kořenovém krčku. Potom je radikálněji seřízneme, zejména čajohybridy (na 3–5 oček), o něco výš floribundy a nejméně polyantry. Popínavé růže kvetou na dvouletém dřevě, proto řez směřujeme spíše ke



Zmarlika AVONDALE



Výsadba jehličnanů

Slunné a teplé počasí urychluje kvetení safránů a láká ven i včely.



s růžemi sadovými a botanickými. Ty můžeme v březnu jednou za čas dobrě zmladit.

- U všech dřevin odstraníme po zimě suché či poškozené větve. Končí období vegetačního klidu, kdy lze kácat dřeviny. Připomínám, že nabyla platnost vyhláška ke kácení dřevin mimo les č. 222/2014, zpříšňující kácení dřevin na soukromých pozemcích u obytných domů či chat.
- Dřeviny s hladkým kmenem jsou nejnáchylnější k tvorbě mrazových desek, opráťme je vhodnou ochranou.

- Vysazujeme stromy i keře, jak prostokříenné, tak dřeviny s balem. Výhodou oproti podzimnímu období je, že můžeme vysazovat i choulostivější druhy, které pak mají celé vegetační období na to, aby si dostatečně přivykly na lokalitu.

- Odstraníme z trávníku zbytky listí.
- V druhé polovině měsíce prořežeme trávník (vertikutace). Zbavíme se tak plstnatosti (mech), širokolistých plevelů a zlepšíme příjem vody, vzduchu i živin. Tím zlepšíme jeho kondici a vzhled.
- Začínáme také hnojit startovacími hnojivy s výšším obsahem dusíku a jiných prvků podporujících růst organické hmoty.
- Můžeme množit dřeviny roubováním, nebo výsevy. Na konci měsíce lze už vysévat i na venkovní záhony.

Petr Hanzelka a Tomáš Vencálek
Foto autoří