



Čtyřlétý stromek angreštu odrůdy MUCURINES – před řezem



Stejný stromek po řezu

Tvarování a řez

Angrešt řezeme převážně v zimě a v předjaří, a to od konce listopadu do začátku března. U odrůd náchylných vůči padlí musíme zkrátit všechny jednoleté výhony (odřežeme i méně vyzrálé dřevo) a tím preventivně bojujeme proti hnědému padlí angreštu.

Doporučujeme stromkovou formu s vyšším kmínkem (0,9 až 1,1 m), přestože lze pěstovat také keře angreštu na vlastních kořenech.

Stromky angreštu vysazujeme ke kolíku nebo drátence tak, aby kůl nebo drát procházel korunkou stromku. Výhony po výsadbě seřezáváme zjara krátce na dva až tři pupeny, slabé výhony na jeden pupen. Z vyrostlých výhonů vybereme čtyři až pět nejsilnějších jako základ korunky. Ve druhém roce zkrátíme ponechané výhony



Detail ořezané šestileté korunky angreštu




Schéma roubování stromkových bobulovin obyčejnou kopulací - Schéma roubování anglickou kopulací

o jednu třetinu až čtvrtinu, a to převážně na vnitřní pupen, což má význam hlavně u odrůd s převislým růstem.

Ve třetím roce a v dalších letech odstraníme z koruny předjarním řezem všechny zahušťující výhony, ostatní výhony zkrátíme na pět až deset pupenů. Správně tvarovaný stromek musí být při sklizni dobře přístupný i uvnitř koruny. Zmlazovat začínáme hlavní větve jejich výměnou za mladší po pěti až šesti letech.

Stromkový angrešt musíme prosvětlovat každoročně, čímž podpoříme tvorbu nových výhonů a zabráníme předčasnému zabácení. Řezeme-li stromkový angrešt pravidelně, hluboký zmlazovací řez není nutný.

